


Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.org.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Вакцинація від COVID-19

Первинна імунізація

Люди віком 18+

Повинні отримати **первинну імунізацію** двома дозами вакцини від COVID-19 (Comirnaty/Pfizer-BioNTech або CoronaVac/Sinovac Biotech) або однією дозою вакцини Janssen (Johnson & Johnson).

Інтервали між введенням дводозних вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 днів

CoronaVac/Sinovac Biotech — 14-28 днів

Діти від 12 років

Можуть щепитися від COVID-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Діти 5-11 років

Можуть щепитися від COVID-19 двома дозами спеціальної вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Інтервал між першою та другою дозою становить мінімум 21 день.

Бустерні щеплення

В Україні **перше бустерне щеплення** можуть зробити:

- **всі люди старші 18 років**, які отримали дві дози вакцини понад 5 місяців тому
- **діти віком 12+** через 6 місяців після другої дози

Друге бустерне щеплення можуть зробити усі люди старші 18 років, які отримали **першу бустерну дозу** вакцини **понад 4 місяці** тому.